

## "مقاله پژوهشی"

# اثر سطوح مختلف فوکوئیدان (Marivet) جیره بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلائی رنگین کمان (*mykiss*) (*Onchorhynchus*)

فریده قالی حاجیوند<sup>۱</sup>، امیر حسین اسماعیلی<sup>۱\*</sup>، عبدالمحمد عابدیان<sup>۱</sup>

۱. گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۹

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۹/۵

## چکیده

فوکوئیدان یک هتروپلی ساکارید محلول در آب است که در دیواره سلولی جلبک های قهوه ای و برخی بی مهرگان یافت می شود. در این تحقیق این هتروپلی ساکارید با هدف بهبود رشد، ترکیب بدن و شاخص های بیوشیمیایی خون به جیره ماهی قزل آلائی رنگین کمان اضافه گردید. بچه ماهیان دارای میانگین وزنی  $18.74 \pm 0.70$  گرم بودند. آزمایش شامل سطوح صفر (شاهد)،  $0.1$ ،  $0.5$ ،  $1$  و  $2$  درصد فوکوئیدان در هر کیلوگرم جیره در قالب پنج تیمار با سه تکرار در تانک های  $100$  لیتری با تراکم  $10$  عدد در هر تانک انجام شد. بر اساس نتایج، بیشترین وزن نهایی، نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن به تیمار  $2$  درصد تعلق داشت ( $P < 0.05$ ). بیشترین فاکتور وضعیت و شاخص احشایی در گروه شاهد، مشاهده شد ( $P < 0.05$ ). میزان چربی و رطوبت در تیمار  $0.5$  درصد فوکوئیدان نسبت به گروه شاهد، دارای تفاوت معنی داری بود ( $P < 0.05$ ). بیشترین میزان پروتئین تام و HDL در تیمار  $0.1$  ( $P < 0.05$ ) مشاهده شد و گروه شاهد بیشترین میزان LDL را نشان داد ( $P < 0.05$ ). بر اساس نتایج این تحقیق فوکوئیدان در دوز  $2$  درصد سبب بهبود عملکرد رشد و در دوز  $0.1$  درصد می تواند اثرات مثبتی بر فاکتورهای بیوشیمیایی خونی بگذارد. اما با توجه به اینکه فوکوئیدان ماده ای با خاصیت تحریک کنندگی سیستم ایمنی بوده و همچنین اثرات مثبتی بر فاکتورهای خونی داشته، پیشنهاد می گردد در دوز  $0.1$  درصد در جیره این ماهی استفاده گردد.

**کلید واژه ها:** قزل آلائی رنگین کمان (*Onchorhynchus mykiss*)، فوکوئیدان (Marivet)، رشد، ترکیب لاشه

## مقدمه

قزل‌آلای رنگین‌کمان یکی از مهم‌ترین گونه‌های آزاد ماهیان بوده که دارای ارزش اقتصادی بالایی است و بخش زیادی از میزان تولید آبریان را به خود اختصاص می‌دهد. نزدیک به ۶۰ درصد از هزینه‌های پرورش این ماهی، مربوط به خوراک است. جلبک‌های خشک شده به‌عنوان مکمل غذایی در آبرزی پروری موجب بهبود عملکرد رشد، تغذیه و کیفیت لاشه در آبریان مختلف می‌شوند (Jaime-Ceballos *et al.*, 2005). جلبک‌های دریایی حاوی ترکیبات مغذی از جمله لیپیدها، پروتئین‌ها، پپتیدها، پلی‌ساکاریدها، رنگدانه‌ها و متابولیت‌های ثانویه (ترکیبات فنولیک) هستند (Wang *et al.*, 2014). پلی‌ساکاریدهایی که به تازگی مورد توجه محققین قرار گرفته‌اند، پلی‌ساکارید های سولفات می‌باشند (رستمی و همکاران، ۱۳۹۵). یکی از این پلی‌ساکاریدهای سولفات، فوکویدان است. اصطلاحی که برای پلی‌ساکاریدهای سولفات، غنی از قند فوکوز که اخیراً مورد توجه جدی قرار گرفته است و مصارف گوناگونی در حوزه سلامت دارد فوکویدان می‌باشد (Li *et al.*, 2008, Ale *et al.*, 2011). در یک بررسی اثر فوکویدان بر رشد ماهی باراموندی نشان داد که اضافه کردن آن به جیره این ماهی سبب بهبود رشد می‌شود (Tuller *et al.*, 2014). Mir و همکاران (2017) عنوان کردند که فوکویدان سبب تقویت رشد در ماهی روهمی شود. با توجه به اینکه هدف اصلی در آبرزی پروری رشد است که در نتیجه سنتز پروتئین ایجاد می‌شود، مطالعات انجام شده حاکی از آن است که پلی‌ساکاریدهای سولفات می‌توانند فاکتورهای رشدی (FG)، فاکتور رشد فیروبلست (FGF) و فاکتور رشد تغییردهنده (TGF) را تنظیم و تحت تأثیر قرار دهند

(Salek-Ardakani *et al.*, 2000). برخی از مطالعات

نشان داند که فوکویدان به عنوان یک پلی‌ساکارید سولفات، می‌تواند با میوستاتین پیوند برقرار کند و فعالیت آن را مهار کند (Ramazanov *et al.*, 2003). بنابراین با توجه به ارتباط، پلی‌ساکاریدهای سولفات با فاکتورهای رشدی، به نظر می‌رسد استفاده از آن‌ها روشی مناسبی برای ارتقاء رشد در ماهیان پرورشی باشند. شایان ذکر است که مطالعات مختلفی گزارش کردند که فوکویدان سبب افزایش رشد میگو می‌شود اما تعداد گزارش‌های مبنی بر اثر این پلی‌ساکارید بر رشد ماهی بسیار کم است (Mir *et al.*, 2017)؛ با توجه به اینکه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به راحتی غذای دستی را می‌گیرد و با محیط پرورشی به آسانی سازگار می‌شود (راستیان نسب و همکاران، ۱۳۹۵)، بنابراین در این تحقیق این نوع پلی‌ساکارید با هدف بهبود عملکرد رشد، تغذیه و ترکیب لاشه به جیره آن اضافه گردید.

## مواد و روش‌ها

این تحقیق در زمستان ۱۳۹۶ در کارگاه تحقیقات آبریان دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. ۲۵۰ عدد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان از کارگاه یاس واقع در شهرستان آمل تهیه و به مدت ۲ هفته در تانک‌های ۳۰۰ لیتری با شرایط جدید پرورش سازگار شدند. در این مدت جیره شاهد به عنوان غذای دوره سازگاری استفاده گردید. پس از انجام مرحله سازگاری، ماهیان با استفاده از گل میخک با غلظت ۶ گرم در ۱۵ لیتر آب بیهوش شدند. سپس زیست‌سنجی اولیه انجام گرفت. ۱۵۰ عدد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزن اولیه  $18.74 \pm 0.7$  به طور

تصادفی انتخاب شدند. ماهیان به ۱۵ تانک فایبرگلاس (۱۰۰ لیتر) با تراکم ۱۰ عدد در هر تانک توزیع گردیدند. غذادهی سه وعده در روز بر اساس درصد وزن بدن، اشتهای ماهی و دمای آب انجام می گرفت. آزمایش در دوره نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی به مدت ۸ هفته انجام گرفت. اندازه گیری عوامل کیفی آب مانند دمای آب از ۱۵ تا ۱۷ درجه در طول دوره پرورش متغیر بود. هوادهی به شکل دائم صورت می رفت و تعویض آب (به طور میانگین ۷۰ درصد آب به صورت روزانه با آب تازه جایگزین می شد) و سیفون کردن روزانه صورت می گرفت. فوکویدان مصرفی جهت استفاده در تیمارهای تعریف شده از شرکت مارینوای استرالیا (Marinova, Hobart, Tasmania) خریداری شد. سپس با توجه به تیمارهای تعیین شده در ۴ سطح ۰/۱، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد در هر کیلوگرم غذا به جیره پایه اضافه گردید (Mir et al., 2017; Yang et al., 2014; Tuller et al., 2014). جهت ساخت جیره ابتدا مواد خشک با مواد معدنی و ویتامینه به مقدار لازم مخلوط شدند و با استفاده از مخلوط کن با هم میکس شدند. در مرحله ی بعد روغن به ترکیب فوق اضافه گردید و مجدداً با هم مخلوط شدند، فوکویدان مورد نیاز برای هر تیمار به

دقت با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت ۰/۰۱ گرم وزن شد و به آب اضافه گردید. سپس به مخلوط فوق اضافه شد. غذای مخلوط شده با چرخ گوشت پلت شد، پلت ها در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت در خشک کن نگهداری شده تا خشک شوند. آنالیز تقریبی جیره نشان داد که جیره تهیه شده حاوی ۴۶/۶۱ درصد پروتئین، ۱۴/۸۰ درصد چربی، ۳/۵۴ درصد رطوبت، ۱۳/۹۵ درصد خاکستر، ۲۱/۱ درصد کربوهیدرات و انرژی جیره ۳۰/۴۰ کیلوژول بر گرم بود. ماهیان به مدت ۸ هفته با جیره های غذایی ساخته شده تغذیه شدند؛ و پس از آن در انتهای دوره، ابتدا ماهیان به وسیله عصاره گل میخک به مقدار ۶ گرم در ۱۵ لیتر آب بیهوش گشته و کل ماهیان مورد سنجش وزنی و طولی قرار گرفتند. درصد زنده مانده (SR) و سایر شاخص های رشد شامل افزایش وزن بدن (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، کارایی پروتئین (PER)، شاخص وضعیت (CF)، مصرف روزانه غذا (DFI)، شاخص کبدی (HIS)، و شاخص امعاء و احشا (VSI)، از طریق رابطه های زیر محاسبه شدند (Luo et al., 2010).

$100 \times (\text{تعداد کل ماهیان در ابتدای دوره} / \text{تعداد ماهیان باقی مانده در انتهای دوره}) = \text{درصد زنده مانده}$

$(\text{وزن ابتدایی به گرم} - \text{وزن انتهایی به گرم}) = \text{افزایش وزن بدن (گرم)} (WG)$

$100 \times (\text{دوره پرورش} / [\ln(\text{وزن ابتدایی}) - \ln(\text{وزن انتهایی})]) = \text{نرخ رشد ویژه (SGR)}$

$(\text{وزن تر به دست آمده به گرم} / \text{مقدار غذای خشک داده شده گرم به}) = \text{ضریب غذایی تبدیل (FCR)}$

$\text{پروتئین مصرفی به گرم} / \text{وزن تر تولید شده به گرم} = \text{کارایی پروتئین (PER)}$

$100 \times (\text{طول نهایی}^3 / \text{وزن نهایی}) = \text{وضعیت شاخص (CF)}$

$100 \times (\text{تعداد روز پرورش} \times 2 / \text{وزن ابتدایی} - \text{وزن انتهایی} / \text{کل مصرف غذا}) = \text{مصرف روزانه غذا (درصد وزن به روز)} (DFI)$

$100 \times (\text{وزن کل بدن به گرم} / \text{وزن کبد به گرم}) = \text{شاخص کبدی (HIS \%)}$

$100 \times (\text{وزن کل بدن به گرم} / \text{وزن امعاء و احشاء به گرم}) = \text{شاخص امعاء و احشا (VSI \%)}$

میزان پروتئین، چربی و خاکستر در ماده خشک اندازه گیری شد، بدین ترتیب که پروتئین خام به روش کجلدال و از طریق تعیین نیتروژن کل و ضرب آن در ضریب  $6/25$  محاسبه گردید ( $6/25 \times$  درصد نیتروژن = درصد پروتئین)، چربی خام از طریق حل کردن چربی در اتر و تعیین مقدار آن به روش سوکسله و با دستگاه سوکسله اتوماتیک انجام شد، رطوبت از طریق قراردادن نمونه در اتوکلاو در حرارت  $105$  درجه سانتی گراد به مدت  $24$  ساعت و خاکستر از طریق قرار دادن نمونه در کوره الکتریکی در حرارت  $550$  درجه سانتی گراد به مدت  $7$  ساعت اندازه گیری شد (AOAC, 1990). برای تعیین مقدار توتال پروتئین و گلوکز از روش رنگ سنجی و HDL و LDL از روش آنزیمی و با استفاده از کیت های شرکت پارس آزمون اندازه گیری شد (Wieland *et al.*, 1995). طرح کلی این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به رشد و سایر پارامترها، از آزمون واریانس یک طرفه (one Way ANOVA) و برای مقایسه میانگین داده ها از آزمون های پارامتریک (دانکن) در سطح اطمینان  $95$  درصد استفاده شد. تمام داده ها به صورت  $ME \pm SD$  گزارش شده و ارزیابی ها در  $3$  تکرار صورت گرفت. از نرم افزار SPSS version23 برای آنالیز آماری و از نرم افزار 2013 Excel برای رسم نمودار و جداول استفاده شد.

## نتایج

نتایج گویای آن بود که وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در جیره های آزمایشی از افزایش معنی داری نسبت به جیره شاهد برخوردار بود ( $P < 0/05$ ). تفاوت معنی داری در میزان ضریب تبدیل

غذایی، کارایی پروتئین، شاخص کبدی، درصد زنده ماندن و مصرف روزانه غذا در بین تیمارها، مشاهده نشد ( $P > 0/05$ ). بررسی فاکتور وضعیت و شاخص احشایی نشان دهنده تفاوت معنی داری در بین گروه های آزمایشی بود ( $P < 0/05$ ) (جدول ۱). نتایج حاکی از آن است که فوکوئیدان تفاوت معنی داری در میزان خاکستر و پروتئین لاشه ایجاد نکرده است ( $P > 0/05$ ) در حالی که در میزان چربی و رطوبت تفاوت معنی داری مشاهده شد ( $P < 0/05$ ) (جدول ۲). مقایسه ی نتایج بیوشیمیایی خون، تفاوت معنی داری را در میزان HDL، LDL و پروتئین تام نشان می دهد ( $p < 0/05$ ) اما از لحاظ میزان گلوکز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید ( $P > 0/05$ ) (جدول ۳).

جدول ۱: اثر سطوح مختلف فوکویدان در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر شاخص‌های رشد و تغذیه

شاخص	صفر	۰/۱	۰/۵	۱	۲
وزن اولیه (g)	۱۸/۲۹ ± ۷/۲	۱۸/۰۶ ± ۶/۹	۱۹/۴۹ ± ۸/۶	۱۹/۶۰ ± ۴/۵	۱۸/۳۴ ± ۹/۳
وزن نهایی (g)	۷۲/۸۰ ± ۲/۹ <sup>a</sup>	۷۴/۹۵ ± ۱/۱۹ <sup>a</sup>	۷۷/۶۶ ± ۱/۳۳ <sup>ab</sup>	۷۷/۲۰ ± ۴/۷۷ <sup>ab</sup>	۸۱/۱۷ ± ۲/۰۷ <sup>b</sup>
افزایش وزن بدن (g)	۵۴/۳۵ ± ۲/۶۳ <sup>a</sup>	۵۶/۲۳ ± ۱/۰۲ <sup>a</sup>	۵۸/۲۶ ± ۲/۱۹ <sup>ab</sup>	۵۷/۵۹ ± ۴/۵۱ <sup>ab</sup>	۶۲/۳۷ ± ۱/۳۵ <sup>b</sup>
فاکتور وضعیت	۱/۱۶ ± ۰/۶ <sup>a</sup>	۱/۰۶ ± ۰/۰۴ <sup>b</sup>	۱/۱۱ ± ۰/۱۰ <sup>ab</sup>	۱/۰۵ ± ۰/۰۷ <sup>b</sup>	۱/۰۷ ± ۰/۰۷ <sup>b</sup>
نرخ رشد ویژه (g/day)	۲/۴۶ ± ۰/۳ <sup>a</sup>	۲/۵۲ ± ۰/۰۲ <sup>ab</sup>	۲/۴۸ ± ۰/۱۲ <sup>a</sup>	۲/۴۴ ± ۰/۰۲ <sup>a</sup>	۲/۶۲ ± ۰/۰۲ <sup>b</sup>
ضریب تبدیل غذایی (%)	۵۹ ± ۰/۳	۶۱ ± ۰/۴	۶۲ ± ۰/۰	۶۰ ± ۰/۴	۶۱ ± ۰/۱
کارایی پروتئین	۳/۶۲ ± ۵/۷	۳/۴۹ ± ۱/۲	۳/۴۳ ± ۰/۴	۳/۵۶ ± ۲/۰	۳/۳۴ ± ۱/۵
مصرف روزانه غذا	۱/۶۲ ± ۱/۹	۱/۷۵ ± ۰/۴	۱/۷۸ ± ۰/۳	۱/۷۱ ± ۰/۹	۱/۷۶ ± ۰/۱
شاخص کبدی (%)	۱/۱۹ ± ۱/۱۹	۱/۰۸ ± ۱/۱۵	۱/۰۵ ± ۱/۱۳	۱/۰۷ ± ۱/۱۴	۱/۰۷ ± ۱/۱۲
شاخص احشایی (%)	۱۰/۹۳ ± ۱/۱۹ <sup>a</sup>	۹/۸۱ ± ۶/۰ <sup>bc</sup>	۱۰/۳۴ ± ۶/۷ <sup>abc</sup>	۹/۶۲ ± ۹/۵ <sup>c</sup>	۱۰/۶۰ ± ۷/۸ <sup>ab</sup>
بازماندگی (%)	۹۳/۳۳	۹۶/۶۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

داده‌ها به صورت Mean ± SD بیان شده‌اند. حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها است ( $P < ۰/۰۵$ ).

جدول ۲: اثر سطوح مختلف فوکویدان در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر ترکیب لاشه (بر حسب درصد وزن ماده خشک)

ترکیب لاشه	صفر	۰/۱	۰/۵	۱	۲
پروتئین	۷۳/۸۲ ± ۱/۲۲	۷۴/۶۴ ± ۰/۵۲	۶۸/۰۸ ± ۵/۵۷	۷۰/۳۰ ± ۴/۱۷	۷۳/۴۴ ± ۱/۵۳
چربی	۲۱/۸۸ ± ۰/۳۶ <sup>a</sup>	۲۰/۲۸ ± ۲/۸۹ <sup>a</sup>	۲۶ ± ۲/۶۸ <sup>b</sup>	۲۳/۵۱ ± ۲/۳۵ <sup>ab</sup>	۲۲/۰۸ ± ۰/۸۸ <sup>a</sup>
رطوبت	۷۴/۴۷ ± ۰/۶۵ <sup>a</sup>	۷۵/۹۴ ± ۰/۷۸ <sup>a</sup>	۷۰/۳۶ ± ۰/۶۵ <sup>b</sup>	۷۴/۶۲ ± ۱/۲۱ <sup>a</sup>	۷۴/۳۶ ± ۱/۵۸ <sup>a</sup>
خاکستر	۴/۳۶ ± ۰/۵۲	۵/۰۷ ± ۰/۷۵	۵/۱۳ ± ۰/۴	۷/۰۳ ± ۰/۸۰	۴/۰۳ ± ۰/۶۰

داده‌ها به صورت Mean ± SD بیان شده‌اند. حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین میانگین‌ها است ( $P < ۰/۰۵$ ).

جدول ۳: اثر سطوح مختلف فوکوئیدان در جیره غذایی ماهی قزل آلائی رنگین کمان بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون

شاخص	صفر	۰/۱	۰/۵	۱	۲
(mg/dl)LDL	$72/66 \pm 4/50^a$	$59/66 \pm 6/80^b$	$63/00 \pm 4/00^b$	$74/66 \pm 4/50^a$	$73/00 \pm 2/82^a$
(g/dl)TP	$3/82 \pm 0/8^a$	$4/31 \pm 0/8^c$	$4/29 \pm 0/2^{bc}$	$4/16 \pm 0/8^b$	$3/94 \pm 0/4^a$
گلوکز (mg/dl)	$32/66 \pm 6/65$	$42 \pm 4/35$	$35/66 \pm 3/21$	$34/66 \pm 1/85$	$36/50 \pm 2/12$

داده‌ها به صورت  $\text{Mean} \pm \text{SD}$  بیان شده‌اند. حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین میانگین‌ها است ( $P < 0/05$ ).

## بحث

بیش‌ترین وزن نهایی، نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن، در تیمار ۲ درصد مشاهده گردید. در گزارشی Tuller و همکاران (۲۰۱۴) بیان نمودند، فوکوئیدان در گربه ماهی موجب افزایش وزن بدن و هیپرتروفی ماهیچه می‌شود. در مطالعه‌ی Ramazanov و همکاران در سال (۲۰۰۳) مشخص شد، پلی-ساکاریدهای سولفات می‌توانند با میوستاتین که به عنوان یک مهار کننده رشد عضلانی مطرح است، پیوند برقرار کنند و فعالیت این پروتئین را مهار کنند. در این تحقیق میزان رشد با افزایش دوز فوکوئیدان افزایش یافته است، بنابراین می‌توان اذعان نمود، تشکیل کمپلکس، هترو پلی ساکارید با میوستاتین، سبب رشد شده است. یکی دیگر از گزارش‌ها در این زمینه، پژوهش Mir و همکاران (۲۰۱۷) است که اثر متیونین و فوکوئیدان را بر ماهی روئو ارزیابی کردند و بیان نمودند، بالاترین دوز فوکوئیدان به همراه کمترین دوز متیونین منجر به افزایش معنی‌دار، ضریب رشد ویژه، کارایی پروتئین و افزایش درصد وزن بدن می‌شود. تاثیرات مفید فوکوئیدان در خصوص رشد، در خوک به اثبات رسیده است. از این اثرات می‌توان

به داشتن نقش پری‌بیوتیکی (Sweeney et al., 2017)، بهبود عملکرد سلول‌های اپیتلیال روده (مانع چسبیدن باکتری‌های همزیست به این سلول‌ها می‌شود) (Heim et al., 2004)، افزایش طول میکروویلی‌های روده و در نتیجه افزایش هضم و بهبود عملکرد رشد (Choi et al., 2017)، اشاره کرد. در آزمایشی Gora و همکاران (۲۰۱۸)، جیره‌های حاوی عصاره فوکوئیدانی را بر ماهی روئو بررسی کردند، در این تحقیق اختلاف معنی‌داری، در میزان رشد مشاهده نشد، آنها بیان کردند، با توجه به اینکه، فوکوئیدان یک مهار کننده تقسیم سلولی است، می‌تواند یک احتمال برای این امر باشد. با وجود اینکه رشد در تیمارهایی که این پلی ساکارید را دریافت کرده بودند، بهبود یافته بود، اما در ضریب تبدیل غذایی آنها، تغییری مشاهده نگردید، احتمال می‌رود، مهار کننده-های رشدی مانند مانیتول، سدیم آلژینات و پلی فیل-های دریایی (Sweeney et al., 2017) که به مقدار جزئی در عصاره‌ی فوکوئیدانی وجود داشتند، دلیل این امر باشد. در پژوهش حاضر میزان فاکتور وضعیت در ماهیان دریافت کننده فوکوئیدان کاهش یافته است.

در مطالعه‌ی Huang و همکاران (۲۰۱۰) مشخص شد که فوکوئیدان سبب فعال شدن لیپاز کبدی می‌شود، در نتیجه با فعال شدن این آنزیم میزان چربی در این کبد و احشاء کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه گفته می‌شود در صورت تجمع چربی در کبد و احشاء شاخص وضعیت زیاد می‌شود، می‌توان فعال شدن آنزیم لیپاز را دلیلی برای کاهش فاکتور وضعیت دانست. ترکیبات چربی، مهمترین جنبه کیفیت غذایی ماهی بوده که بسته به نوع تغذیه ماهی دچار تغییر می‌شود (Medina et al., 1995). مطالعات قبلی نشان دادند که مکمل‌های جلبکی، تجمع چربی، در بدن ماهی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. عوامل زیادی مانند ژنتیک، غدد درون ریز، محیط و تغذیه نقش مهمی در چربی ذخیره شده در بدن ایفا می‌کنند که از همه مهم‌تر تحت تاثیر تغذیه می‌باشد (Kim et al., 2009). Kim و همکاران بیان نمودند که فوکوئیدان به واسطه MAP کیناز می‌تواند باعث مهار تمایز سلول دیپوسیت شود و از این طریق تجمع چربی در بدن را کاهش می‌دهد. علاوه بر این Xu و همکاران (۲۰۱۷) طی مطالعه‌ای اعلام نمودند که فوکوئیدان می‌تواند به وسیله تحریک لیپولیز، افزایش فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز، آدیپوس تری گلیسرید لیپاز و هیدرولیز آدیپوس تری گلیسرید، ذخیره چربی در بدن را کاهش دهد. با این حال نتایج به دست آمده از این مطالعه با یافته‌های بالا همسو نمی‌باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در تیمار ۰/۵ میزان چربی در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافته است، که این نتایج با یافته‌های Zamannejad و همکاران (۲۰۱۴) که اثر جلبک *Sargassum ilicifolium* را در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بررسی کردند، مطابقت دارد. علاوه بر این Traifalgar و

همکاران (۲۰۱۴)، که در مطالعه‌ای اثر جیره فوکوئیدان را بر میگوی ژاپنی بررسی کردند، تفاوت معنی‌داری، در ترکیب لاشه مشاهده نکردند. تغییر در چربی بدن می‌تواند، سبب بهبود شرایط فیزیولوژی و ترکیبات بدن شود که با طعم و مزه ماهی ارتباط تنگاتنگی دارد (Niu et al., 2015). از سوی دیگر با توجه به رابطه‌ی چربی با پروتئین در تیمار ۰/۵ درصد که میزان چربی آن افزایش یافته است مقدار رطوبت در این تیمار کاهش یافته است. فاکتورهای سرمی مانند گلوکز، لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) و پروتئین کل نقش مهمی، در سلامت بدن ماهی ایفا می‌کنند (Hui et al., 2012). در این پژوهش میزان HDL و توتال پروتئین به شکل معنی‌داری در تیمار ۰/۱ درصد، در مقایسه با گروه شاهد، افزایش یافته است و میزان LDL در تیمار ۰/۱ درصد به طور معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد، افزایش یافته است. مطالعات زیادی نشان داده‌اند که فوکوئیدان نقش مهمی در کاهش کلسترول، چربی و قند خون دارد (Yang et al., 2014). گزارشی Yang و همکاران (۲۰۱۴) که فوکوئیدان را به دوشکل تجاری و عصاره تهیه کرده بودند در گربه ماهی مورد آزمایش قرار دادند، آن‌ها عنوان کردند که فوکوئیدان هر دوشکل آن موجب کاهش HDL و LDL و گلوکز می‌شود. فوکوئیدان به وسیله بهبود بیان گیرنده‌های لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) و فعال-سازی آنزیم‌های لیپوپروتئین لیپاز، لیپاز کبدی و لستین کلسترول آسیل ترانسفراز می‌تواند لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) را کاهش دهد (Wu et al., 2003).

صورت گیرد. و با توجه با افزایش چربی نیاز به سنجش آنزیم‌های لیپازی نیز است و علاوه بر مطالب گفته شده، پیشنهاد می‌شود که ارتباط این پلی ساکارید با فاکتور-های رشد خصوصا میوستاتین بررسی شود.

### سپاسگزاری

در اینجا بر خود لازم می‌دانیم از زحمات کلیه کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند سپاسگزاری نماییم.

نتایج حاصله از این آزمایش نشان می‌دهد که فوکوئیدان اثرات مثبتی بر رشد و فاکتورهای بیوشیمیایی خون داشته اما بر فاکتورهای تغذیه‌ای بدون تاثیر بوده و در خصوص ترکیب لاشه سبب افزایش میزان چربی و کاهش رطوبت در تیمار ۰/۵ شده است با جمع بندی این نتایج می‌توان نتیجه گیری کرد که این پلی ساکارید در دوز بالا سبب بهبود عملکرد رشد و در دوز پائین اثرات مثبتی بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون دارد و همچنین در خصوص فاکتورهای تغذیه‌ای باید تحقیقات بیش تری در زمینه‌ی نقش پری بیوتیکی آن، تاثیر آن بر آنزیم‌های هضمی و طول میکروبی‌ها

### منابع

۱. راستیان نسب، ا.، موسوی، م.، ذوالقرنین، ح.، صحافی زاده، ه.، ۱۳۹۵. بررسی پروبیو آنزیم بر بیان ژن‌های وابسته به ایمنی و کنترل بیماری دهان قرمز (Yersiniosis) در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*)، مجله علمی شیلات ایران. ۲۶ (۱)، ۱۵۳-۱۶۶.
۲. رستمی، ز.، طبرسا، م.، رضایی، م.، ۱۳۹۵. ساختار شیمیایی و خواص بیولوژیک پلی ساکارید های سولفات استخراچ شده از جلبک های دریایی سبز. مجله‌ی علوم فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۱۶-۹۷، (۱)۵.
3. Ale, M.T., Mikkelsen, J.D. and Meyer, A.S., 2011. Important determinants for fucoidan bioactivity: A critical review of structure-function relations and extraction methods for fucose-containing sulfated polysaccharides from brown seaweeds. Marine drugs, 9, 2130-2116.
4. AOAC (Association of Official Analytical Chemists), 1990. Official methods of analysis AOAC, Washington, DC, 1263.
5. Choi, Y., Hosseindoust, A., Goel, A., Lee, S., Jha, P. K., Kwon, I. K., & Chae, B. J., 2017. Effects of Ecklonia cava as fucoidan-rich algae on growth performance, nutrient digestibility, intestinal morphology and caecal microflora in weanling pigs. Asian-Australasian journal of animal sciences, 30(1), 64.
6. Gora, A. H., Sahu, N. P., Sahoo, S., Rehman, S., Dar, S. A., Ahmad, I., & Agarwal, D., 2018. Effect of dietary Sargassum wightii and its fucoidan-rich extract on growth, immunity, disease resistance and antimicrobial peptide gene expression in *Labeo rohita*. International Aquatic Research, 10(2), 115-131.
7. Huang, X., Zhou, H., & Zhang, H., 2006. The effect of *Sargassum fusiforme* polysaccharide extracts on vibriosis resistance and immune activity of the shrimp, *Fenneropenaeus chinensis*. Fish & shellfish immunology, 20(5), 750-757.
8. Heim, G., Sweeney, T., O'shea, C. J., Doyle, D. N., & O'doherty, J. V. 2015. Effect of maternal dietary supplementation of laminarin and fucoidan, independently or in combination, on pig growth performance and aspects of intestinal

- Cystoseira canariensis* bind to serum myostatin protein. *Acta Physiologica and Pharmacologica. Bulgarica*, 27, 101-106.
18. Salek-Ardakani, S., Arrand, J. R., Shaw, D., & Mackett, M., 2000. Heparin and heparan sulfate bind interleukin-10 and modulate its activity. *Blood*, 96, 1879-188.
19. Sweeney, T., Meredith, H., Vigors, S., McDonnell, M. J., Ryan, M., Thornton, K., & O'Doherty, J. V., 2017. Extracts of laminarin and laminarin/fucoidan from the marine macroalgal species *Laminaria digitata* improved growth rate and intestinal structure in young chicks, but does not influence *Campylobacter jejuni* colonisation. *Animal Feed Science and Technology*, 232, 71-79.
20. Traifalgar, R.F., Kira, H., Thanh Tung, H., Raafat Michael, F., Laining, A., Yokoyama, S., Ishikawa, M., Koshio, S., Serrano, A.E. and Corre, V., 2010. Influence of dietary fucoidan supplementation on growth and immunological response of juvenile *Marsupenaeus japonicus*. *Journal of the World Aquaculture Society*, 41, 235-244.
21. Tuller, J., De Santis, C., & Jerry, D. R., 2014. Dietary influence of Fucoidan supplementation on growth of *Lates calcarifer* (Bloch). *Aquaculture research*, 45, 749-754.
22. Traifalgar, R. F., Kira, H., Thanh Tung, H., Raafat Michael, F., Laining, A., Yokoyama, S., & Corre, V., 2010. Influence of dietary fucoidan supplementation on growth and immunological response of juvenile *Marsupenaeus japonicus*. *Journal of the World Aquaculture Society*, 41, 235-244.
23. Wang, L., Wang, X., Wu, H. and Liu, R., 2014. Overview on biological activities and molecular characteristics of sulfated polysaccharides from marine green algae in recent years. *Marine Drugs*, 12, 4984-5020.
24. Wu, Q. H., Xing, Y. H., Rong, X. L., & Huang, P., 2007. Influence of FPS on the expression of LDL-R mRNA in the liver tissues of hyperlipidemic rats. *Zhong yao cai= Zhongyaocai= Journal of Chinese medicinal materials*, 30(8), 968-970.
- health. *Animal Feed Science and Technology*, 204, 28-41.
9. Hui, F. U., Wang, Q. K., Yun-Hai, H. E., & Ren, D. D., 2012. Functional effect of dietary fiber from seaweed *Costaria costata* residues on reduce in serum lipids in mice. *Journal of Dalian Ocean University*, 27, 200-204.
10. Jaime-Ceballos, B., Villarreal, H., Garcia, T., Perez-Jar, L., & Alfonso, E. 2005. Effect of *Spirulina platensis* meal as feed additive on growth, survival and development in *Litopenaeus schmitti* shrimp larvae. *Revista de investigaciones marinas*, 26, 235-241.
11. Kim, M. J., Chang, U. J., & Lee, J. S., 2009. Inhibitory effects of fucoidan in 3T3-L1 adipocyte differentiation. *Marine biotechnology*, 11, 557-562.
12. Li, B., Lu, F., Wei, X., & Zhao, R. 2008. Fucoidan: structure and bioactivity. *Molecules*, 13, 1671-1695.
13. Luo, G., Xu, J., Teng, Y., Ding, C., & Yan, B., 2010. Effects of dietary lipid levels on the growth, digestive enzyme, feed utilization and fatty acid composition of Japanese sea bass (*Lateolabrax japonicus* L.) reared in freshwater. *Aquaculture research*, 41(2), 210-219.
14. Medina, I., Sacchi, R., & Aubourg, S. P., 1995. A <sup>13</sup>C-NMR study of lipid alterations during fish canning: Effect of filling medium. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 69, 445-450.
15. Mir, I. N., Sahu, N. P., Pal, A. K., & Makesh, M., 2017. Synergistic effect of l-methionine and fucoidan rich extract in eliciting growth and non-specific immune response of *Labeo rohita* fingerlings against *Aeromonas hydrophila*. *Aquaculture*, 479, 396-403.
16. Niu, J., Chen, X., Lu, X., Jiang, S. G., Lin, H. Z., Liu, Y. J., ... & Tian, L. X. 2015. Effects of different levels of dietary wakame (*Undaria pinnatifida*) on growth, immunity and intestinal structure of juvenile *Penaeus monodon*. *Aquaculture*, 435, 78-85.
17. Ramazanov Z., Jimenez del Rio M. & Ziegenfuss T., 2003. Sulfated polysaccharides of brown seaweed

- constituents, anti-oxidation and innate immunity of juvenile yellow catfish (*Pelteobagrus fulvidraco*). Fish & shellfish immunology, 41(2), 264-270.
28. Zamannejad, N., Emadi, H., & Hafezieh, M., 2016. Effects of supplementation of algae (*Sargassum ilicifolium*) on growth, survival and body composition of rainbow trout *Oncorhynchus mykiss*. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15, 194-205.
  25. Wieland, O. H., Deufel, T., & Paetzke-Brunner, I., 1985. Free and esterified carnitine: colorimetric method. Methods of enzymatic analysis, 8, 481-488.
  26. Xu, P., Wang, Y., Chen, J., Yang, R., & Zhou, Q., 2017. Lipidomic profiling of juvenile yellow head catfish (*Pelteobagrus fulvidraco*) in response to Fucoidan diet. Aquaculture International, 25, 1123-114.
  27. Yang, Q., Yang, R., Li, M., Zhou, Q., Liang, X., & Elmada, Z. C., 2014. Effects of dietary fucoidan on the blood