

# ارزیابی روش‌های مختلف استخراج DNA از ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان طلایی پرورشی (Golden Rainbow Trout: *Oncorhynchus mykiss*) بهمنظور مطالعه مولکولی

**بهاره‌اکبرنژاد<sup>۱</sup>، سیامک یوسفی‌سیاه‌کلروودی<sup>\*</sup><sup>۲</sup>، شهره زارع کاریزی<sup>۱</sup>**

۱- گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوای، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، صندوق پستی: ۷۴۸۹-۳۳۸۱۷

۲- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوای، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، صندوق پستی: ۷۴۸۹-۳۳۸۱۷

تاریخ دریافت: ۱۰ آذر ۱۳۹۶      تاریخ پذیرش: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

## چکیده

استخراج DNA یک گام معمول در بسیاری از مطالعات بیولوژیکی است و روش‌های مختلفی جهت جداسازی مولکول DNA از مواد بیولوژیکی ابداع شده است. بسیاری از این روش‌ها دارای سه هدف: ۱- لیز سلول و خروج اسیدنوکلئیک از مایع درون‌سلولی، ۲- از بین بردن مولکول‌های آلی و معدنی غیر از اسیدنوکلئیک در مایع درون‌سلولی و ۳- به حداقل رساندن تخریب اسیدنوکلئیک‌ها در طی مراحل خالص‌سازی می‌باشند. ماهی قزل‌آلای رنگین کمان از جمله گونه‌های اهلی شده آزادماهیان بوده و امروزه مهم‌ترین گونه ماهی سرد‌آبی در کشور است. جهت انجام این پژوهش ۴ روش استخراج: ۱- کیت استخراج شرکت All Gena Reagent، ۲- Trizol Reagent، ۳- روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K و ۴- فل کلروفرم موربدبرسی قرار گرفت و مشخص شد که بهترین روش استخراج ازلحاظ کیفیت و کمیت DNA استخراج شده توسط دستگاه نانودرایپ و ژل آکاروز ۱ درصد و همچنین ازلحاظ کارآمد بودن PCR مربوط به روش کیت استخراج DNA شرکت Gene All کشور کره جنوبی است.

**کلمات کلیدی:** قزل‌آلای رنگین کمان طلایی پرورشی، استخراج شرکت All Gena، کیت استخراج شرکت PCR

در ایران در دوره‌های مختلف (Kincaid, *et al.*, 1977)

تخم چشم زده این ماهیان از چندین کشور مانند دانمارک، فرانسه، نروژ، ایتالیا و انگلیس وارد کشور شده و به صورت غیراصولی با یکدیگر اختلاط پیدا کرده و پرورش یافته‌اند که خود سبب ایجاد آسیبهای جدی به ذخیره ژنی قزل‌آلاهای پرورشی در ایران شده است. هم‌چنین به علت تلاقی بیش از حد نژادهای مولدین موجود، کاهش رشد و تلفات زیاد در بچه ماهیان قزل‌آلابه وجود آمده است. بسیاری از بچه ماهیان موجود نیز ناهنجاری‌های شکلی را نشان می‌دهند (عبدالحی، ۱۳۸۳). در این صورت توان تولید ماهیان کاهش و بهای تمام شده محصول افزایش خواهد یافت؛ بنابراین، شاید بتوان از وقوع غیرعمدی هم‌خونی و رانش ژنتیکی که ناشی از کوچک بودن جمعیت ماهیان موجود در مراکز تکثیر است به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش توان تولید و افزایش هزینه تولید نام برد (Aulstad and Kittlesen, 1971).

به طور کلی برای به حداکثر رساندن پتانسیل بیولوژیکی ماهیان، یکی از اهداف مدیریت کارگاه‌های تکثیر، به کارگیری اصول اساسی ژنتیک و اصلاح نژاد است. بنابراین تنوع ژنتیکی برای بقای طولانی مدت یک گونه ضروری است (Bataillon, *et al.*, 1996). مدیریت تنوع ژنتیکی در موجودات، نیازمند ارزیابی ساختار ژنتیکی و تفکیک ذخایر گونه موردنظر است (Pujolar, *et al.*, 2009). از تحقیقات انجام گرفته در زمینه مقایسه روش‌های مختلف استخراج DNA در آبزیان می‌توان به تبرک و همکاران (۱۳۹۵) که به مقایسه کارایی سه روش استخراج DNA از باله و فلس اردک ماهی (*Esox Lucius*) پرداختند، طحان زاد و همکاران (۱۳۹۵) که به بررسی روش ساده و کارا برای

## مقدمه

استخراج DNA یک گام معمول در بسیاری از مطالعات بیولوژیکی از جمله شناسایی مولکولی، استنتاج فیلوژنیک، ژنتیک و ژنوم است. علاوه بر این استخراج DNA اغلب در معاینات پزشکی، تشخیص بالینی و تحقیقات پزشکی قانونی استفاده می‌شود؛ بنابراین روش‌های مختلفی جهت جداسازی مولکول DNA از مواد بیولوژیکی ابداع شده است (Milligan, 1998) و انواع مختلفی از کیت استخراج DNA به صورت تجاری در دسترس است (Chen, *et al.*, 2010).

بسیاری از این روش‌ها دارای سه هدف: ۱- لیز سلول و خروج اسیدنوکلئیک از مایع درون‌سلولی، ۲- از بین بردن مولکول‌های آلی و معدنی غیر از اسیدنوکلئیک در مایع درون‌سلولی و ۳- به حداقل رساندن تخریب اسیدنوکلئیک‌ها در طی مراحل خالص‌سازی می‌باشند (Tsai and Olson, 1991; MacGregor, *et al.*, 1997; Hurt, *et al.*, 2001).

استخراج تأثیرات متفاوتی روی DNA استخراج شده دارند (Waldschmidt, 1997; Chen, *et al.*, 2008).

در یک تکنیک، ایده آل استخراج با استی عملکرد DNA بهینه‌سازی شود، تخریب DNA به حداقل رسد و از لحاظ زمان، نیروی کار و منابع کارآمد باشد (Chen, *et al.*, 2010).

ماهی قزل‌آلای رنگین کمان از جمله گونه‌های اهلی شده آزاد ماهیان بوده که اگرچه در ایران گونه‌ای غیربومی محسوب می‌شود، اما به سبب مزایای بی‌شماری که از خود در سامانه‌های پرورشی نشان داده است، امروزه مهم‌ترین گونه ماهی سرد‌آبی در کشور است (دrafshan, ۱۳۸۵). این گونه در سراسر جهان پراکنده شده و ۷۵ نژاد متمایز، تولید کرده است

سانتی گراد خارج گردیدند و در دمای اتاق قرار داده شدند تا از حالت فریز درآیند. از هر نمونه باله دمی بچه ماهیان ۲۰ میلی گرم با ترازوی دیجیتال با دقیق ۰/۱ میلی گرم وزن گردید و در میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتر قرار داده شد.

مراحل استخراج DNA با کیت استخراج DNA شرکت All Gene کشور کره جنوبی به شرح زیر است:

- CL Buffer به میزان ۲۰۰ میکرولیتر به نمونه ها اضافه گردید و به کمک دستگاه هموژنایزر هموژن شدند.

- آنزیم پروتئیناز K به میزان ۲۰ میکرولیتر به نمونه ها اضافه گردید، به مدت ۲۰ ثانیه ورتكس شدند، جهت لیز شدن به مدت ۱ ساعت در دمای ۵۶ درجه سانتی گراد ترموبلاک انکوبه گردیدند و اسپین شدند.

- BL Buffer به میزان ۲۰۰ میکرولیتر به تیوب ها اضافه گردید، به مدت ۲۰ ثانیه ورتكس شدند، به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد انکوبه گردیدند و اسپین شدند.

- اتانول مطلق به میزان ۲۰۰ میکرولیتر به تیوب ها اضافه گردید، ورتكس و اسپین گردیدند و به ستون های فیلتر دار انتقال داده شدند.

- با دور xg ۶۰۰۰ (۸۰۰۰ rpm) به مدت ۱ دقیقه سانتریفیوژ گردیدند و مواد عبور کرده از فیلتر spin column ها دور اندخته شدند.

- ۶۰۰ میکرولیتر BW Buffer اضافه گردید، با دور xg ۶۰۰۰ (۸۰۰۰ rpm) به مدت ۱ دقیقه سانتریفیوژ گردیدند و مواد عبور کرده از فیلتر spin column ها دور اندخته شدند.

جداسازی DNA ژنومیک از بافت های کنه میگو بيري سبز (*Penaeus semisulcatus*) مناسب برای PCR معکوس پرداختن و رجی و همکاران (۱۳۹۵) که به مقایسه روش های متفاوت استخراج DNA از بافت های (*Conus coronatus*) مختلف حزاون مخروطی دریایی پرداختند می توان اشاره نمود. لذا اولین قدم در انجام این گونه مطالعات مولکولی به دست آوردن DNA ژنومی باکیفیت و کمیت مناسب است؛ بنابراین این پژوهش به منظور تعیین بهترین روش استخراج DNA از نمونه ماهیان قزلآلای رنگین کمان طلایی پرورشی صورت گرفته است.

## مواد و روش ها

به منظور انجام این پژوهش در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۰۰ قطعه بچه ماهی قزلآلای رنگین کمان طلایی پرورشی از مجتمع پرورش ماهی ارجمند واقع در ۵ کیلومتری شهرستان فیروزکوه در استان تهران تهیه شد و در فلاکس یخ قرار داده شدند و به آزمایشگاه بیولوژی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله انتقال داده شدند و تا ادامه روند پژوهش در فریزر ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. جهت انجام استخراج از باله دمی بچه ماهیان ۴ روش مختلف استخراج DNA: ۱- روش استخراج با کیت استخراج DNA شرکت All Gene کشور کره جنوبی (اکبرنژاد، ۱۳۹۵)، ۲- روش (Hongbao, et al., Trizol Reagent 2008)، ۳- روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K (Innis, et al., 1990) و ۴- روش فتل کلروفرم (Sambrook, et al., 1989) قبل از شروع مراحل استخراج، بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان طلایی پرورشی از فریزر ۲۰- درجه

- به مدت ۱۵ دقیقه با دور  $xg$  ۱۲۰۰۰ در دمای ۴ درجه سانتی گراد سانتریفیوژ شدند. سه فاز ایجاد گردید. فاز مایع رویی RNA، فاز وسط فاز جامد و فاز مایع پایینی DNA است.

- فاز مایع پایینی که حاوی DNA است، جدا گردید و هم حجم آن ایزوپروپانول اضافه گردید.

- به مدت ۱ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد انکوبه شدند.

- به مدت ۱۰ دقیقه با دور  $xg$  ۱۲۰۰۰ در دمای ۴ درجه سانتی گراد سانتریفیوژ شدند. مایع رویی حذف گردید و رسوب حاوی DNA است.

- به رسوب حاوی DNA، ۵۰۰ میکرولیتر اتانول ۷۵ درصد اضافه گردید و سپس ورتسکس شدند.

- به مدت ۵ دقیقه با دور  $xg$  ۱۰۰۰۰ در دمای ۴ درجه سانتی گراد سانتریفیوژ شدند. مایع رویی حذف و به رسوب که همان DNA است، مقدار ۵۰ میکرولیتر آب دو بار تقطیر اضافه گردید.

- به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه گردیدند تا رسوب DNA در آب دو بار تقطیر حل گردد و درنهایت به یخچال با دمای ۴ درجه سانتی گراد انتقال یافتد (Hongbao, *et al.*, 2008).

مراحل استخراج DNA با روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K به شرح زیر است:

- ۲۰۰ میکرولیتر بافر لیز سلول به میکروتیوب های ۱/۵ حاوی نمونه باله دمی بچه ماهیان اضافه گردید، به طوری که کل بافت را پوشاند.

- جهت حذف پروتئین ها مقدار ۱۰ میکرولیتر آنزیم پروتئیناز K اضافه گردید و ۱ دقیقه ورتسکس شدند.

- به مدت ۴ ساعت در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد انکوبه شدند.

- ۷۰۰ میکرولیتر TW Buffer اضافه گردید، با دور  $xg$  ۶۰۰۰ (۸۰۰ rpm) به مدت ۱ دقیقه سانتریفیوژ گردیدند و مواد عبور کرده از فیلتر spin column ها دور انداخته شدند.

- با دور  $xg$  ۱۳۰۰۰ به مدت ۱ دقیقه سانتریفیوژ گردیدند تا TW Buffer باقی مانده حذف گردد.

- ۵۰ میکرولیتر از AE Buffer که برای مدتی در دمای اتاق قرار داده شده بود به مرکز ستون ها منتقل گردید و بعد از ۱ دقیقه انکوبه شدن در دمای اتاق با دور  $xg$  ۱۳۰۰۰ به مدت ۱ دقیقه سانتریفیوژ گردیدند. مایع حاصله از سانتریفیوژ که حاوی DNA استخراجی بود جهت نگهداری به دمای ۴ درجه سانتی گراد انتقال داده شدند (اکبرنژاد، ۱۳۹۵).

مراحل استخراج DNA با روش Trizol Reagent به شرح زیر است:

- ۲۰۰ میکرولیتر Trizol به میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتری حاوی نمونه باله دمی بچه ماهیان اضافه گردید به طوری که کل بافت را پوشاند.

- ۱۰ میکرولیتر آنزیم پروتئیناز K اضافه گردید و به مدت ۱ دقیقه به خوبی ورتسکس شدند.

- به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شدند.

- ۱۰۰ میکرولیتر بافر لیز سلول اضافه گردید و به مدت ۲ دقیقه ورتسکس شدند.

- به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۵۶ درجه سانتی گراد انکوبه شدند.

- ۱۰۰ میکرولیتر کلروفرم اضافه گردید و میکروتیوب ها به شدت تکان داده شدند تا دو فاز نمایان گردد.

- به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتفاق انکوبه شدند.

- به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه گردیدند تا رسوب DNA در آب دو بار تقطیر حل گردد و درنهایت به يخچال با دمای ۴ درجه سانتی گراد انتقال یافتد (Sambrook, et al., 1989).

جهت بررسی کیفیت و کمیت DNA های استخراج شده در هر ۴ روش مذکور از روش متداول (Moore, et al., 1990) درصد ۱ آگاروز ۱ درصد (Innis, et al., 1990) و دستگاه نانودراب استفاده شد. سپس جهت تکثیر ژن Tyrosine در ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان طلایی پرورشی به طول ۴۲۳ جفت باز از آغاز گرهای اختصاصی (Lori et al., 1999) Tyr1.2f و Tyr1.2r با توالی‌های:

Tyr1.2r ۵ CCTCCCTACTCTGACATCGT<sup>3</sup>  
Tyr1.2f ۵ CAGCTCAGACTATGTCATC<sup>3</sup>

استفاده گردید. به منظور انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) ژن Tyrosine در حجم ۲۰ میکرولیتر از ۱۰ میکرولیتر مستر میکس، ۱ میکرولیتر DNA استخراجی، ۱ میکرولیتر پرایمر مستقیم، ۱ میکرولیتر پرایمر معکوس و ۷ میکرولیتر آب دو بار تقطیر تحت شرایط سکیل دمایی دستگاه ترموسایکلر ذیل صورت پذیرفت: واسرتسته‌سازی کلی به مدت ۵ دقیقه در دمای ۹۶ درجه سانتی گراد، واسرتسته سازی به مدت ۴۰ ثانیه در دمای ۹۶ درجه سانتی گراد، اتصال پرایمرها به مدت ۴۰ ثانیه در دمای ۵۸/۶ درجه سانتی گراد، بسط اولیه پرایمر به مدت ۴۰ ثانیه در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد و سرانجام بسط نهایی پرایمر به مدت ۷ دقیقه در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد برای ۳۰ سیکل در مراحل ۲ تا ۴ تنظیم گردید. نهایتاً محصولات PCR روی ژل آگاروز ۱ درصد حاوی رنگ سیف استین الکتروفورز شدند.

- به منظور خنثی کردن فعالیت آنزیم پروتئیناز K به مدت ۵ دقیقه در دمای ۹۵ درجه سانتی گراد انکوبه گردیدند.

- به مدت ۱۰ دقیقه با دور xg ۱۰۰۰۰ سانتریفیوژ شدند. مایع رویی حاوی DNA را جدا کرده و به میکروتیوب ۱/۵ میلی لیتری جدیدی انتقال داده و در دمای ۴ درجه سانتی گراد يخچال نگهداری شدند (Innis, et al., 1990).

مراحل استخراج DNA با روش فل کلروفرم به شرح زیر است:

- ۲۵۰ میکرولیتر STE به میکروتیوب‌های ۱/۵ میکرولیتری حاوی نمونه باله دمی بچه ماهیان اضافه گردید.

- به کمک دستگاه هموژنایزر نمونه‌ها به خوبی هموژن گردیدند.

- ۱۰ میکرولیتر آنزیم پروتئیناز K اضافه گردید.

- به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد انکوبه شدند.

- به مدت ۱۰ دقیقه با دور xg ۱۰۰۰۰ سانتریفیوژ شدند.


- مایع رویی که حاوی DNA است جداشده و هم حجم آن فل کلروفرم اضافه گردید.

- به مدت ۱۰ دقیقه با دور xg ۱۰۰۰۰ سانتریفیوژ شدند.

- مایع رویی که حاوی DNA است جداشده و هم حجم آن ایزوپروپانول اضافه گردید.

- به مدت ۱ تا ۲ ساعت در فریزر ۲۰- درجه سانتی گراد قرار داده شدند.

- به مدت ۲۰ دقیقه با دور xg ۱۵۰۰۰ سانتریفیوژ شدند. مایع رویی حذف و به رسوب که همان DNA است، مقدار ۵۰ میکرولیتر آب دو بار تقطیر اضافه گردید.



(۱) کیت استخراج Gene All  
شرکت Trizol reagent  
(۲) روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K  
(۳) روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K  
(۴) فل کلروفورم

شکل ۱: نتایج کیفیت و کمیت استخراج DNA با استفاده از ۴ روش استخراج DNA-۱-کیت استخراج DNA شرکت Trizol reagent-۲-Gene All-۳-روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K-۴-فل کلروفورم روی ژل آگاروز ۱ درصد

نتایج کیفیت و کمیت استخراج شده روی ژل آگاروز ۱ درصد نشان داد که بهترین کیفیت و کمیت DNA استخراج شده از لحاظ عدم آلودگی و شارپ بودن باندهای ایجاد شده مربوط به روش کیت استخراج شرکت Gene All است و در سایر روش‌ها عدم شارپ بودن باندها و وجود اسمیر که نشان‌دهنده آلودگی است دیده شد (شکل ۱).

نتایج حاصل از تکثیر ژن تیروزیناز با استفاده از تکنیک PCR در شکل‌های ۲ تا ۵ آورده شده است.


در این مطالعه ۴ روش استخراج DNA روی ۱۰۰ نمونه از باله دمی ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان طلایی مقایسه شدند. نتایج کیفیت و کمیت نانو دراپ استخراج DNA با روش‌های مختلف در جدول شماره ۱ آورده شده است.

جدول ۱: مقایسه ۴ روش استخراج DNA از باله دمی ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان


روش منیر	زمان	نماینده	بنگاه غلت	نسبت جذب نوری	روش متبر
کیت استخراج DNA شرکت Gene All	<۳h	۱/۸۲	۱۲۰/۳		
روش استخراج Trizol Reagent	<۳h	۱/۲۰	۶۰/۸		
روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K	>۴h	۰/۹۶	۷۱/۱		
الکل ابروایل فل کلروفورم	>۴h	۱/۴۸	۹۱/۵		

در جدول ۱ بیشترین و کمترین غلظت به ترتیب مربوط به روش‌های کیت استخراج DNA شرکت Gene All و روش Trizol Reagent بود و هم‌چنین بیشترین و کمترین نسبت جذب نوری (OD) مربوط به روش‌های کیت استخراج DNA شرکت Gene All و روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K بود.


نتایج کیفیت و کمیت استخراج DNA روی ژل آگاروز ۱ درصد به ترتیب در شکل ۱ آورده شده است.




شکل ۲: نتیجه واکنش PCR روی ژن Tyrosinase در روش فنل کلروفرم باند 423bp در چاهک های شماره ۱، ۴ و ۷ مشاهده شد.



شکل ۳: نتیجه واکنش PCR روی ژن Tyrosinase در روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K



شکل ۴: نتیجه واکنش PCR روی ژن Tyrosinase در روش استخراج Trizol



شکل ۵: نتیجه واکنش PCR روی ژن Tyrosinase کیت استخراج DNA شرکت All Gene

گرفت. طی انجام این پژوهش ۳ متغیر غلظت، طیف جذب نوری و زمان مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که بهترین روش استخراج مربوط به روش کیت استخراج DNA شرکت All Gene کشور کره جنوبی است. باندهای ایجادشده توسط این روش شارپ بوده و از کیفیت مناسبی برخوردار هستند و می‌توانند در تحقیقات مولکولی نظری بررسی تنوع ژنتیکی، بررسی چندشکلی ژنتیکی و ... در ماهیان قزلآلای رنگین کمان مورداستفاده قرار گیرد تا بتوانیم توسط تکنیک‌هایی نظری PCR-RFLP، PCR و ... ژنوم این گونه از ماهیان را مورد تمایز قرار دهیم. در بررسی کیفیت و کمیت DNAهای استخراج شده در هر ۴ روش توسط دستگاه نانو دراپ به نظر می‌آمد که هر ۴ روش از غلظت و طیف جذب نوری قابل قبولی برخوردار هستند، اما در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز Gene All (PCR) به جز روش کیت استخراج شرکت All (PCR) مشاهده گردید که چند باند کم رنگ و تا حدودی روش فنل کلروفرم که می‌تواند به علت وجود آلدگی ناشی از RNA، پروتئین، لیپید و

نتایج به دست آمده از تکثیر ژن تیروزیناز مشخص نمود که باند 423bp تنها در روش کیت استخراج DNA شرکت All با موفقیت کامل تکثیر شده است (شکل ۵) و این در حالی است که در روش فنل کلروفرم (شکل ۲) چند باند بیشتر تشکیل نگردید و در دو روش دیگر سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K و Trizol reagent باوجود غلظت و خلوص تا حدودی قابل قبول هیچ باند مشاهده نگردید (شکل ۳ و ۴). از مزیت دیگر استخراج به روش کیت استخراج شرکت All می‌توان به زمان پاسخ‌دهی کمتر نسبت به سایر روش‌های ذکر شده در جدول ۱ اشاره نمود.

## بحث

پژوهش انجام شده باهدف مقایسه ۴ روش استخراج DNA از ماهی قزلآلای رنگین کمان طلایی پرورشی Golden Rainbow Trout: *Oncorhynchus mykiss* به منظور مشخص نمودن بهترین روش استخراج DNA جهت مطالعه مولکولی در ماهیان قزلآلای رنگین کمان طلایی پرورشی موردنبررسی قرار

RNA، پروتئین، لیپید و سایر ساختارهایی که مانع از عملکرد صحیح آنزیم‌ها محدودگر و مهارکننده‌ها در طی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) می‌شود اعلام داشتند. تبرک و همکاران (۱۳۹۵) به مقایسه کارایی سه روش استخراج DNA از اردک‌ماهی پرداختند و برخلاف تحقیق حاضر هر سه روش استخراج از جمله روش فل کلروفرم را کارآمد اعلام داشتند. همچنین پژوهش حاضر با مطالعه داوودی و همکاران (۱۳۸۸) که به مقایسه روش‌های استخراج DNA از بافت پارافینه با دو روش کیت تجاری و روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K پرداخته بودند هم خوانی نداشت. آن‌ها بهترین روش استخراج DNA را برخلاف تحقیق حاضر روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K اعلام کردند. در تحقیق حاضر چهار روش مختلف استخراج DNA شامل ۱- کیت استخراج شرکت All Gena، ۲- Trizol Reagent، ۳- روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K و ۴- فل کلروفرم موردنبررسی قرار گرفت و مشخص شد که بهترین روش استخراج از لحاظ کیفیت و کمیت DNA استخراج شده توسط دستگاه نانودرایپ و ژل آگاروز ۱ درصد و همچنین از لحاظ کارآمد بودن مربوط به روش کیت استخراج DNA شرکت PCR Gene All کشور کره جنوبی است.

### سپاسگزاری

در اینجا بر خود لازم می‌دانیم از زحمات کلیه کسانی که مارا در انجام این تحقیق یاری نمودند سپاسگزاری نماییم.

سایر ساختارهایی باشد که مانع از عملکرد صحیح آنزیم‌ها محدودگر و مهارکننده‌ها در طی واکنش (Berthomieu and PCR) می‌شود (Meyer, 1991; Jeanpierre, 1987) پژوهش کیالاشه‌کی و همکاران (۱۳۹۱) که به ارزیابی ۵ روش استخراجی DNA کیست ژیاردی‌لامبليا پرداخته است، هم خوانی دارد. کیالاشه‌کی و همکاران مشخص نمودند که در روش جوشاندن همانند روش سنتی حرارت و آنزیم پروتئیناز K استفاده شده در پژوهش حاضر هیچ باندی در طی فرآیند تکثیر توسط تکنیک PCR ایجاد نشده است و در روش فل کلروفرم همانند روش فل کلروفرم پژوهش حاضر چند باند در کل نمونه‌های موردنبررسی بیشتر نمایان نشده است و بهترین (FGK Accuprep) روش استخراج را روش کیت اعلام کردند. همچنین پژوهش حاضر با پژوهش رحیمی کلده و همکاران (۱۳۹۲) که به بررسی تفاوت کیفیت و کمیت DNA استخراج شده از زنبورهای پارازیتوئید توسط ۵ روش استخراج پرداخته بودند که طی آن روش استخراج Chelex را بهترین روش اعلام کردند و روش‌های دیگر از جمله فل کلروفرم را به دلیل تعداد مراحل زیاد، افزایش آلودگی و هزینه زیاد مطلوب اعلام نداشتند با نتیجه پژوهش حاضر که روش فل کلروفرم را ناکارآمد اعلام داشتیم هم خوانی دارد. در مطالعه دیگر محامی اسکوبی و همکاران (۱۳۹۰) به مقایسه روش‌های مختلف استخراج DNA به منظور مطالعه مولکولی انگل فاسیولا پرداختند و مشخص نمودند که بهترین کیفیت و بازده PCR مربوط به دو روش Chelex و کیت استخراج است و علت ناکارآمد بودن سایر روش‌های استخراج از جمله روش فل کلروفرم را همانند تحقیق حاضر وجود آلودگی ناشی

۶. رحیمی کلده، س.، حسینی، ر.، حاجی زاده، ج.، ۱۳۹۲. مقایسه کمیت و کیفیت روش‌های مختلف استخراج DNA از زنبورهای پارازیتوئید جنس (*Lysiphlebus*) به روش اسپکتروفوتومتری. نشریه حفاظت گیاهان، جلد ۲۷، شماره ۳، صفحات ۴۰۶-۴۰۲.
۷. طحانزاده، ن.، حسینی، س.، ج.، علیزاده، ر.، غلامی‌دشتی، ف.، نظریان، م.، ۱۳۹۵. روش ساده و کارا برای جداسازی DNA ژنومیک از بافت‌های کنه میگو ببری سبز (*Penaeus semisulcatus*) مناسب برای PCR معکوس. فصلنامه محیط زیست جانوری، دوره هشتم، شماره ۴، صفحات ۲۳۶-۲۲۷.
۸. عبدالحی، ح.، سید قمی، م.، پورکاظمی، م.، رضوانی، س.، نادری منش، ح.، ۱۳۸۳. مطالعه جامع ژنتیک مولکولی و اصلاح نژاد ماهیان سرآبی ایران. موسسه تحقیقات شیلات ایران. ۴۴صفحه.
۹. کیالاشکی، الف.، شریف، م.، فخار، م.، دریابی، الف.، پقه، ع.، ۱۳۹۱. ارزیابی روش‌های مختلف استخراج DNA از کیست ژیاردیا لامبیلا. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و دوم، شماره ۹۸، صفحات ۷۴-۶۷.
۱۰. محامی اسکوبی، م.، دلیمی اصل، ع.، فروزنده مقدم، م.، رکنی، م. ب.، ۱۳۹۰. مقایسه روش‌های مختلف استخراج DNA به منظور مطالعه مولکولی انگل‌های فاسیولا. نشریه دامپزشکی، شماره ۹۲، صفحات ۳۵-۳۱.
11. Aulstad, D., Kittlesen, A., 1971. Abnormal body curvatures of rainbow trout (*Salmo gairdneri*) inbred fry. J. Fish. Res. Board Can, Vol. 28, pp: 1918-1920.

### منابع

۱. اکبرنژاد، ب.، ۱۳۹۵. بررسی چندشکلی ژن تیروزیناز در ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته زیست‌شناسی گرایش ژنتیک. دانشکده تحصیلات تکمیلی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوای ۷۸صفحه.
۲. تبرک، م.، کلباسی مسجد شاهی، م. ر.، علوی یگانه، م. ص.، ۱۳۹۵. مقایسه کارایی سه روش استخراج DNA از باله و فلس اردک ماهی (*Esox Lucius*) ژنتیک در هزاره سوم، شماره ۳، سال یازدهم، صفحات ۳۲۰۵-۳۲۰۰.
۳. داودی، ه.، هاشمی، س. ر.، او亨گ فوننگ، س.، قربانی، م.، ۱۳۸۸. مقایسه روش‌های استخراج DNA از بافت‌های پارافینه با استفاده از روش سنتی حرارت و روش تجاری استفاده از کیت. مجله علوم آزمایشگاهی، دوره سوم، شماره ۲، صفحات ۳۳-۲۹.
۴. درافشان، س.، ۱۳۸۵. دستکاری‌های کروموزومی ماهی آزاد دریای خزر (*Salmo trutta caspius*) و قزل‌آلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) جهت پرورش نسل F1. رساله دکتری تخصصی. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. دانشگاه تربیت مدرس. ۱۴۴صفحه.
۵. رجبی، ح.، ذوالقرنین، ح.، رونق، م. ت.، سواری، الف.، شریف‌رنجبر، م.، ۱۳۹۵. مقایسه روش‌های متفاوت استخراج DNA از بافت‌های مختلف حلزون مخروطی دریابی (*Conus coronatus*). مجله زیست‌شناسی جانوری تجربی، سال ۴، شماره ۴، صفحات ۱۹-۲۵.

21. Lori, A. Passmore., Barbara Kaesmann-Kellner Bernhard, H. F. Weber., 1999. Novel and recurrent mutations in the tyrosinase gene and the P gene in the German albino population. *Hum Genet*, Vol. 105, pp. 200-210.
22. MacGregor, B. J., Moser, D. P., Alm, E. W., Nealson, K. H., Stahl, D. A., 1997. Crenarchaeota in Lake Michigan sediment. *Appl, Environ, Microbiol*, Vol. 63, pp. 1178–1181.
23. Milligan, B. G., 1998. Total DNA isolation. In: Hoelzel AR, editor. *Molecular Genetic Analysis of Population: A Practical Approach*, 2<sup>nd</sup> Edition. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press, pp. 29–64.
24. Moore, G., Cheung, W., Schwarzacher, T., Flavell, R., 1991. BIS-I, a major component of the cereal genome and a tool for studying genomic organisation. *Genomics*, Vol. 10, pp. 469-476.
25. Pujolar, J. M., Deleo, G. A., Ciccotti, E., Zane, L., 2009. Genetic composition of Atlantic and Mediterranean recruits of European eel *Anguilla anguilla* based on EST-linked microsatellite loci. *Journal of Fish Biology*, Vol. 74, pp. 2034-2046.
26. Sambrook, J., Fritsch, E. F., Maniatis, T., 1989. *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, 2nd Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, pp. 1626.
27. Tsai, Y. L., Olson, B. H., 1991. Rapid method for direct extraction of DNA from soil and sediments. *Appl, Environ, Microbiol*, Vol. 57, pp. 1070–1074.
28. Waldschmidt, A. M., 1997. Extraction of genomic DNA from (*Melipona quadrifasciata*) Hymenoptera: Apidae, Meliponinae. *Braz J Genet*, Vol. 20, pp. 421–423.
12. Bataillon, T. M., David, J. L., Schoen, D.J., 1996. Neutral genetic markers and conservation: Simulated germplasm collections. *Genetics*, Vol. 144, pp: 409-417.
13. Berthomieu, P., Meyer, C., 1991. Direct amplification of plant genomic DNA from leaf and root pieces using PCR. *Plant Mol Biol*, Vol. 17, pp. 555-557.
14. Chen, M., Zhu, Y., Tao, J., Luo, Y., 2008. Methodological comparison of DNA extraction from (*Holcocerrus hippophaecolus*) Lepidoptera: Cossidae for AFLP analysis. *For Study China*, Vol. 10, pp. 189–192.
15. Chen, H., Rangasamy, M., Tan, S. Y., Wang, H., Siegfried, B. D., 2010. Evaluation of five methods for total DNA extraction from western corn rootworm beetles. *PLoS one*, Vol. 5, No. 8, pp. e11963.
16. Hongbao, M. a., Young, J., Shen, C., 2008. RNA, DNA and protein isolation using TRIzol reagent. *Nature and Science*, Vol. 6, No. 3, pp. 66-75.
17. Hurt, R. A., Qiu, X., Wu, L., Roh, Y., Palumbo, A. V., Tiedje, J. M., et al. 2001. Simultaneous recovery of RNA and DNA from soils and sediments. *Appl, Environ, Microbiol*, Vol. 67, pp. 4495–4503.
18. Innis, M. A., Gelfand, D. H., Sninsky, J. J., 1990. *White TJ. PCR Protocol; A Guide to Methods and Applications*. 1st. Academic Press, Inc. New York, pp. 482.
19. Jeanpierre, M., 1987. A rapid method for the purification of DNA from blood. *Nucleic Acid, Research*, Vol. 15, No. 22, pp. 9611.
20. Kincaid, H.L., Bridges, W.R., Vonlimbach, B., 1977. Three generations of selection for growth rate in fall spawning rainbow trout. *Transactions of the American Fisheries Society*, Vol. 106, pp: 421-428.